

Lider_S

WAPNIOWO
-SIARKOWY 43-17

Удобрювальне вапно карбонатне сорт 05 (60%)
сорт 06 (40%) активоване та гранульоване

ДЖЕРЕЛО КАЛЬЦІЮ І СІРКИ

Основні параметри:

- швидкий ефект
- реактивність >98%
- $SO_3 < 17\%$
- тверда гранула
- вологість <5%
- Пакування:
500 кг, 25 кг

Дози добрив в кг/га

Забезпечення потреб рослин у Ca та S залежно від очікуваного врожаю			
КУЛЬТУРА	ДОЗУВАННЯ	КУЛЬТУРА	ДОЗУВАННЯ
Пшениця	200-300	Силосна кукурудза	400-600
Ячмінь	200-300	Зернова кукурудза	600-800
Овес	250-350	Лугові угіддя	400-600
Жито	200-300	Бобові	400-600
Рапс	500-700	Цукровий буряк	400-600

На кислих використовувати в поєднанні з добривом ЛІДЕР



ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА ҐРУНТІ

SYSTEM MicroActive

Розроблена нами технологія активації вапна шляхом дуже тонкого подрібнення доломітових порід, в результаті чого ми отримуємо активні частинки вапна розміром менше 10 мікрон.

Кращий ефект - Менша доза

3 рази вища активність в порівнянні зі звичайним доломітом, такий самий ефект при 3 рази нижчій дозі добрива в перший рік після застосування.

Високоточне землеробство

Діє відразу після внесення, що дозволяє підібрати дозування для конкретної культури.

Зменшення витрат на добрива

Підтримання правильного рівня рН підвищує ефективність добрив NPK до 70%. За допомогою вапняного добрива ми можемо зменшити внесення NPK, зберігаючи при цьому врожайність, або підтримувати внесення добрив і підвищити врожайність.

Джерело кальцію і сірки

Окрім підтримання правильного рівня рН шляхом нейтралізації щорічних підкислюючих факторів (вилуговування вапна, внесення азотних добрив, видалення вапна із врожаєм), добриво задовольняє потреби рослин у макроелементах Ca та S. Використання сірчаного вапна є найдешевшим джерелом сірки для рослин

Легкий посів

Тверда, однорідна та 100% розчинна гранула, просіяна та знепилена, дозволяє висівати вапно всіма сівалками для внесення добрив без пилу.


Замість води купуйте вапно

Мінімальний вміст води, завдяки кінцевому процесу сушіння.

Герметична упаковка


Фольгована вкладка в мішку дозволяє зберігати добрива на вулиці.

Вплив подрібнення вапна на швидкість дії




Відсоток ґрунтів із дефіцитом сірки

Джерело: компанія ADOB



Відсоток ґрунтів із дефіцитом сірки



**Вміст CaCO_3 60%,
 CaSO_4 40%.
Грануляція 2-6 мм**

Інструкція по застосуванню

Продукт висівати за допомогою стандартних сільськогосподарських розкидачів. Орієнтовні дози в таблиці. Застосовувати з весни до осені передпосівно під агрегат або подушно. Не застосовувати разом з натуральними добривами. Не змішувати з фосфатом амонію, сульфатом амонію та суперфосфатом.

Запобіжні заходи

Добривне вапно нетоксичне і не вимагає особливих заходів. Слід дотримуватися звичайних правил безпеки та гігієни. Під час посіву захищати очі та дихальні шляхи.

Спосіб зберігання

Зберігати продукт в індивідуальній упаковці в чистих сухих складських приміщеннях або на відкритому повітрі в штабелях, захищених від води. При правильному зберіганні знадобиться для використання безстроково.

Lider

Виробник:

ROLPOL Otdakowscy sp.j., Szepietowo, ul. Towarowa 1
tel. 86 47 70 300, www.nawozylider.pl

ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА ҐРУНТІ